

# Guía de Aves

Jardín Botánico y Arboretum Universidad de Talca





## Presentación



Esta recopilación es una guía visual y auditiva que contiene información de las especies de aves que se observan en el Jardín Botánico y Arboretum de la Universidad de Talca.

Está compuesta por 42 fichas, cada una de ellas entrega información sobre una especie, sus características generales y morfológicas, su alimentación y los periodos del año en que es posible observarla.

Este registro fotográfico es el resultado del trabajo entre los años 2015 a 2025 de Luis Araya Rodríguez, funcionario de la Universidad de Talca desde 1991.

Actualmente desempeña labores de técnico en Microscopia y encargado del área de docencia en el Instituto de Ciencias Biológicas. Además de sus actividades en la Casa de Estudios, junto a otros funcionarios, fundó y preside la ONG Raíces del Lircay, la cual tiene como finalidad registrar e identificar las distintas especies de aves que viven y migran en costas, humedales, precordillera y ríos de la Región del Maule.

La recopilación de información y fotografías de Luis Araya Rodríguez se transformaron en este material de divulgación gracias al proyecto “VíncuLAB: Una nueva concepción institucional de la Vinculación con el Medio”.

Se trata de un proyecto financiado por el Mineduc, cuyo objetivo es fortalecer el modelo de gestión de la vinculación con el medio de la Universidad de Talca para contribuir al desarrollo social, ambiental y territorial del Maule, a través de la formación, investigación, divulgación y co-creación de soluciones entre la comunidad universitaria y la ciudadanía.

Esta guía busca ser un aporte y compañía para los visitantes del Jardín Botánico a la hora de observar e identificar la avifauna del lugar, reconociendo así la biodiversidad de la Región del Maule.

## Contextualización

El Jardín Botánico es un espacio natural que la Universidad de Talca abre a la comunidad en 2001, gracias a un convenio de cooperación con la Universidad Técnica de Dresden, Alemania.

Cuenta con 10 hectáreas de extensión donde conviven formaciones vegetales de Chile y el mundo. A través de las especies botánicas se pueden recorrer cinco continentes, entre ellas destacan el Bosque Mesofítico Mixto de América del Norte, el Bosque Caducifolio de Europa Central y el Bosque Esclerófilo de la región australiana.



En este espacio habitan cerca de 60 especies entre aves, mamíferos, peces y reptiles.

Colindante al Jardín Botánico, se encuentra el Arboretum, un área natural de tres hectáreas que alberga distintas especies forestales nativas y alóctonas.

Además de sus atractivos senderos que permiten apreciar la biodiversidad del lugar, cuenta con sectores de descanso, dos lagunas artificiales y plazas con juegos infantiles.

El Jardín Botánico y Arboretum de la Universidad de Talca, es uno de los sitios de interés destacados en la Región del Maule para el avistamiento de aves. Según el registro de la Plataforma de Ciencia Ciudadana eBird, aquí se han registrado 75 distintas especies.

¡Te invitamos a visitar este laboratorio natural, hay mucho que descubrir y cada rincón te sorprenderá!

\*Información actualizada Octubre 2025.



## Índice de especies

PÁG.	ESPECIE
10	Aguilucho
12	Benteveo
14	Cachudito
16	Chercán
18	Chincol
20	Chirihue
22	Chuncho
24	Codorniz
26	Colegial
28	Diucón
30	Fío - Fío
32	Garza Chica
34	Garza Grande
36	Golondrina
38	Corrión
40	Halcón Peregrino
42	Huairavo
44	Jilguero
46	Jote Cabeza Negra
48	Jote Cabeza Roja
50	Loica

PÁG.	ESPECIE
52	Mirlo
54	Paloma Común
56	Pato Colorado
58	Pato Jergón Chico
60	Picaflor Chico
62	Picurio
64	Pidén
66	Playero
68	Queltehue
70	Rara
72	Run - Run
74	Tagua Frente Roja
76	Tagüita
78	Tijeral
80	Tiuque
82	Tordo
84	Tortolita cuyana
86	Tórtola
88	Trile
90	Yeco
92	Zorzal Patagónico

# Aguilucho



## Aguilucho

*Buteo polyosoma*

Es una especie elegante y atractiva. Posee un cuerpo esbelto con alas largas puntiagudas y cola larga de lados paralelos. Esta ave tiene un tamaño de 35 - 43 cm. de largo y una envergadura de 88 - 102 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de pequeños mamíferos que caza.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Benteveo

## Benteveo

*Pitangus sulphuratus*

Es un ave cazamoscas voluminosa y baja, de cabeza y pico negro proporcionalmente grandes. Su cabeza negruzca posee una ancha lista superciliar blanca y dorso negruzco hasta la rabadilla. Esta especie mide 24,5 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar ocasionalmente.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de larvas, lombrices, insectos, frutas, pequeños roedores, reptiles y peces.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Cachudito



## Cachudito

*Anairetes parulus*

Es un ave pequeña passeriforme de cresta delgada y cola larga y angosta. Posee un pico completamente negro y cara oscura con conspicuo ojo amarillo. Su pupila, típicamente oscura, es resaltada por el iris amarillo, lo que le da un aspecto soñoliento. Esta especie mide entre 11 - 12 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Sus alimentos son larvas e insectos.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Chercán



## Chercán

*Troglodytes aedon*

Es un ave pequeña de pico algo curvado hacia abajo. Posee una cola larga normalmente levantada y su garganta blanquecina, flancos posteriores y coberteras subcaudales de color canela claro. Esta especie mide 11 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de insectos.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Chincol

## Chincol

*Zonotrichia capensis*

Es un ave de tamaño pequeño, cuyo largo varía entre los 14 - 16 cm de largo. Tiene una corona en punta, con cabeza rayada de fondo gris, lista pileal lateral y lista ocular negras. Su dorso es pardo con estrías negruzcas y sus alas pardas con dos gruesas barras blancas.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento son semillas e insectos.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Chirihue



## Chirihue

*Sicalis luteola*

Es un ave pequeña de 13 cm, de pico y alas cortas. Es uno de los Chirihues Chilenos visiblemente estriados por debajo. Esta especie posee un patrón facial distintivo, con área periocular amarilla en contraste con sus mejillas y el lorum oscuros.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de semillas, insectos y frutos.



# Chuncho

## Chuncho

*Glaucidium nanum*

Es un chuncho típico, pequeño y con cabeza grande y cola corta, comparado con el chuncho del norte, de ojos relativamente chicos, cola grande y larga y alas más largas y puntiagudas. Su tamaño es de 17 - 21 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de reptiles, aves y mamíferos.

# Codorniz



## Codorniz

*Callipepla californica*

Es un ave que mide 25 cm, es ligeramente más grande que un zorzal y mucho más robusta. Tiene su cabeza plana y una pluma en su cabeza, su pico es muy corto. Esta especie fue introducida en Chile en el año 1870 desde California, actualmente abunda en zonas agrícolas, bordes de pastizales cerca de matorrales y vegetación nativa.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de semillas de frutos, flores e insectos pequeños.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Colegial



## Colegial

*Lessonia Rufa*

Es una especie de ave cazamoscas, es decir, pequeño, fornido, de cola corta, patas largas, pico chico y alas más bien redondeadas. El macho se destaca por su color negro con manto rojizo, la hembra tiene el mismo manto rojizo pero su cabeza es grisácea y ligeramente más clara. Esta ave mide 11,5 cm aproximadamente.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar en temporada de invierno.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento consiste en insectos, arácnidos y micro crustáceos.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Diucón



## Diucón

*Xolmis pyrope*

Es un gran cazamoscas de postura alerta vertical, con una silueta distintiva, mide 21 cm. Esta especie posee una cabeza grande, aplanada por arriba y su garganta prominente. Este diucón tiene ojos rojos brillantes. Pluma gris, más oscura en las alas y la corona, con llamativa garganta blanca.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento son insectos y bayas.

# Fío - Fío



## Fío - Fío

*Elaenia albiceps*

Es un ave de la familia de los tiránidos. Su tamaño es estándar y su color característico es oliváceo apagado con anillo ocular blanco y dos gruesas barras alares blancas. Esta especie, suele mantener la cresta erecta, descubriendo el parche blanco en el centro de la corona. Su medida es de 15 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar en las estaciones primavera – verano.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, semillas, bayas y brotes tiernos de árboles frutales.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Garza Chica



## Garza Chica

*Egretta thula*

Es un ave esbelta, de cuerpo pequeño y pico delgado y puntiagudo. Su cuerpo y alas son totalmente blancos. Esta especie mide entre 56 - 66 cm y posee un penacho detrás de la nuca, la base del cuello y el lomo.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Su alimentación consiste en peces pequeños, ranas, camarones e insectos acuáticos.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Garza Grande



## Garza Grande

*Ardea alba*

Es un ave que mide entre 85 - 105 cm. Posee un fuerte pico de base gruesa y cuello largo y sinuoso. Su cara desnuda luce una cuña extendida debajo y detrás del ojo y su pico amarillo con culmen más oscuro.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de peces, ranas, camarones, pequeños mamíferos y reptiles.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Golondrina



## Golondrina

*Tachycineta Leucopiga*

Es un ave fornida y de cola un poco marginada. Esta especie se caracteriza por tener su garganta y partes inferiores blancas, lados del pecho teñido de gris. De cara azul y garganta blanca separadas nítidamente desde la base de la mandíbula inferior hasta los lados del cuello. Esta especie mide entre 12 - 13,5 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de moscas, libélulas, mosquitos, saltamontes, escarabajos, grillos, mariposas y polillas.

# Gorrión



## Gorrión

*Passer domesticus*

Es una especie de ave passeriforme bajo y robusto, de cabeza grande, con pico corto y cónico. El macho se diferencia de la hembra por su pico negro, en cambio la hembra posee un pico color cuerno. Su medida es de 15 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de semillas, pero cuando se encuentra en las ciudades de desperdicios.

¡Escúchalo!

Escanea este código QR





# Halcón Peregrino

## Halcón Peregrino

*Falco peregrinus*

Es un ave voluminosa, de vientre prominente y aspecto potente, sus alas largas alcanzan la punta de su cola en reposo. Su cola es de color gris azulado con finas bandas negruzcas. Esta especie tiene un largo de 38 - 50 cm y una envergadura de 95 - 117 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de aves que el mismo caza.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Huairavo



## Huairavo

*Nycticorax nycticorax*

Es una garza compacta, jorobada y de cuello corto de 58 a 65 cm de altura. Sus patas son de color amarillo y sus ojos rojos. La subespecie oscura común se presenta en todo el país, incluso en la costa.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de peces, crustáceos, insectos, lagartijas, lombrices, huevos y crías de aves.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Jilguero



## Jilguero

*Spinus barbata*

Es un ave única en el sur y las tierras bajas del centro de Chile. Esta especie mide 12 cm, tiene pico corto, alas negruzcas con dos barras y parche amarillo más reducido que en los demás jilgueros.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar en primavera hasta principio del verano.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de semillas.

# Jote Cabeza Negra



## Jote Cabeza Negra

*Coragyps atratus*

Es un ave de 56 - 74 cm de largo con una envergadura de 133 - 160 cm. Vuela con alas planas, no en ángulo, por lo que no se balancea en vuelo, debido a que bate sus alas varias veces rápido y luego planea. Esta especie es un gran buitres negro de cola corta y cabeza gris oscura, desnuda y arrugada.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de carroña.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Jote Cabeza Roja



## Jote Cabeza Roja

*Cathartes aura*

Es un buitre grande pardo negruzco, que vuela con largas alas claramente levantadas formando una "V". A veces vuela bajo, raramente bate sus alas. Esta especie posee una cabeza desnuda de color rojo brillante y sus alas con dos tonos por debajo. Mide 62 - 76 cm y con las alas abiertas 160 - 182 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de carroñas y rara vez mata presas.



# Loica

## Loica

*Leistes loyca*

Es un ave que mide entre 25 - 28 cm. Su estructura es muy esbelta, por lo que puede recordar a un tordo típico, debido en parte a su cola más larga, que le hace parecer más delgada de lo que es en realidad. Esta ave posee un pico largo y muy puntiagudo.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento son granos como el trigo, maíz, variedad de insectos, hormigas, arañas y bulbos de algunas plantas silvestres.

# Mirlo

## Mirlo

*Molothrus Bonariensis*

Es tordo delgado y colilargo de largo pico muy fino y puntiagudo. Mide de 19 - 20 cm aproximadamente. El macho normalmente es completamente negro, ya que las coberteras pequeñas amarillas pueden quedar tapadas cuando está posado. La hembra en cambio, parada y estriada, posee una ancha ceja beige claro en contraste con la lista ocular oscura.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de todo tipo de insectos, gusanos, frutas y a veces semillas.

# Paloma Común



## Paloma Común

*Columba livia*

Es un ave mediana, baja y robusta, de pecho prominente y cola relativamente corta. Mide entre 30 - 36 cm. Esta especie tiene un vuelo poderoso con alas puntiagudas, como un halcón.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de semillas, bayas, bellotas, migajas de pan y palomitas de maíz.

# Pato Colorado

## Pato Colorado

*Spatula cyanoptera*

Es un pequeño pato de pico grande con punta relativamente ancha, no tan exagerada como en el pato cuchara, pero notoria. Esta especie posee pico gris negruzco. El macho es de color canela rojizo y ojos rojos, en cambio la hembra es color pardo cálido con tonos rojizos. Su tamaño es 38 - 48 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar ocasionalmente.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento son plantas acuáticas, pequeños renacuajos y moluscos.



# Pato Jergón Chico

## Pato Jergón Chico

*Anas flavirostris*

Es un pequeño pato robusto y cuellicorto, de cabeza oscura en contraste con el pecho y flancos claros. Su pico es amarillo brillante con culmen y punta oscuros. Esta especie mide entre 40 - 44 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de hierbas, semillas y algas acuáticas.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Picaflor Chico



## Picaflor Chico

*Sephanoides Sephanioides*

Es verde, pequeño y macizo, de cola verdosa y vistosa con una mancha blanca detrás del ojo. Esta especie mide entre 9 - 11 cm y posee un pico bastante corto y recto. Sus partes inferiores son de color grisáceo claro, tinte verde en los flancos y moteado fino de la garganta del vientre.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar desde fines del invierno hasta el verano.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de néctar de flores y complementa su dieta con insectos, arañas. Esta especie puede visitar de 500 a 3 mil flores al día.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Picurio



## Picurio

*Podilymbus podiceps*

Es un ave de tipo zambullidor pequeño y compacto, pardusco y de característico pico grueso, como el de un pollo. En la estación reproductora su pico es gris azulado con una lista vertical negra. Esta especie mide 32 cm y posee cuello y cabeza de tono grisáceo y garganta negra.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar ocasionalmente.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de peces y sus huevos, de crustáceos y plantas acuáticas.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR





# Pidén

## **Pidén**

*Pardirallus sanguinolentus*

Es un ave negruzca, grande y voluminosa que mantiene la cola levantada o la mueve arriba y abajo. Esta especie posee un pico de base ancha, algo curvado hacia abajo. La base de su mandíbula superior es de color celeste con verde y su base inferior de color roja. Mide entre 28 - 38 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento consiste en insectos, larvas, lombrices y vegetales.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Playero



## Playero

*Calidris mauri*

Es un ave patilargo y esbelto, de pico largo, fino y ligeramente curvado. De color grisáceo, con cuello gris y partes inferior blancas. Esta especie tiene marcada oscura la lista ocular. Sus medidas son 18 - 23 cm de largo.



### AVISTAMIENTO

: Es un visitante regular pero muy escaso en Chile. ¡Es un registro muy especial para el área!



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de moluscos, insectos, vegetación verde y semillas.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Queltehue



## Queltehue

*Vanellus chilensis*

Es un ave grande, robusta y colicorta que mide 36 cm. Es de cabeza grande con frente pronunciada y corona plana. Su patrón de colores llamativo es negro en la frente y cara, rodeado por una línea blanca delgada, con un cuerpo verde oliváceo brillante, pico rosado brillante con la punta negra y patas de un vivo rosado rojizo.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, lombrices y semillas.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Rara



## Rara

*Phytotoma rara*

Es un ave passeriforme baja y robusta, de pico corto como el de un Fringílido, un poco más chico que el Zorzal. Esta especie tiene ojos rojos brillante y pico negro, sus plumajes contrastan con el color ladrillo desde la garganta hasta la cola, una cola oscura de base rojiza y las franjas blancas muy visibles en sus alas. Su tamaño es de 18 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar ocasionalmente.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de hojas, hierbas, brotes, frutas y ocasionalmente insectos.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Run - Run



## Run - Run

*Hymenops perspicillatus*

Es un cazamoscas robusto y más bien colicorto, de 16 cm. Su pico es de color amarillo limón y puntiagudo. Como es típico en los cazamoscas terrestres, el Run-Run tiene patas largas. En el vuelo, las alas se ven anchas y redondeadas.



### AVISTAMIENTO

Ave migratoria que puede ser vista en periodo primavera-verano. En periodo otoño-invierno migra a Argentina.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento es a base de insectos y materia vegetal.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Tagua Frente Roja



## Tagua Frente Roja

*Fulica rufifrons*

Es una especie con dorso más aplanado que las otras taguas. Debido a que posee una cola más larga que las otras taguas, esta especie nada con la popa más alta normalmente levantada, mostrando las coberteras subcaudales blancas. Esta ave mide 36 - 43 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar ocasionalmente.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de plantas acuáticas.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Tagüita



## Tagüita

*Pophryriops melanops*

Es un ave acuática de tamaño mediano. Su cabeza, cuello y pecho son de color gris azulado, con la parte frontal de la cara de color negro. Tiene la espalda y alas de color castaño rufo, aunque las plumas de su abdomen y flancos son de un color pardo oscuro con lunares blancos, al igual que su colita. Tiene un pico y escudo frontal de color amarillo verdoso de aspecto fluorescente. Esta ave tiene unas largas patas con dedos aplanados de color amarillo verdoso. Perteneció al orden Gruiformes y a la familia Rallidae, que se caracterizan por ser aves acuáticas, de alas cortas y cuerpo compacto.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de brotes de plantas acuáticas tanto de superficie como de fondo.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR





# Tijeral

## Tijeral

*Leptasthenura aegithaloides*

Es un ave pequeña, que mide entre 15 a 18 cm, posee una cola muy larga y pico corto en forma de clavija. Las plumas de su cola son puntiagudas y muy graduadas, con rectrices internas más largas. Esta especie tiene una corona rojiza con listas oscuras en contraste con la lista superciliar clara y la cara estriada.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar en la temporada primavera – verano.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta principalmente de insectos.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Tiuque



## Tiuque

*Daptrius chimango*

Es un ave pequeña y pardusca, de pico chico y expresión más bien afable debido a sus grandes ojos. Esta especie mide 40 cm de largo y tiene una envergadura de 80 - 99 cm. Posee una cera rosácea restringida, no colorida como la de sus parientes, y su pico es de color gris claro de punta verdosa.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, babosas, gusanos y aves.

# Tordo



## Tordo

*Curaeus curaeus*

Es una especie grande y voluminosa, de pico largo y en punta, las plumas de su garganta son puntiagudas, creando una apariencia barbuda y desordenada. Esta ave mide entre 24 - 29 cm.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos, semillas, incluido el arroz y forraje sobre el suelo.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Tortolita cuyana



## **Tortolita cuyana**

*Colombina Picui*

Es un ave esbelta, relativamente colilarga y de patas cortas, por lo que camina balanceándose un poco y moviendo cómicamente la cabeza. Esta especie mide 18 cm y es de color pardo grisáceo con algunas partes blancas. Su pico es pequeño de color negro y sus ojos son blancos.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de todo, desde semillas, granos, hierbas, insectos, verduras hasta migajas de pan.

# Tórtola



## Tórtola

*Zenaida auriculata*

Es un ave mediana de 23 - 28 cm, esbelta y de cola alargada. Su cara y cuello son de color ocre cálido y posee una corona gris y parche iridiscente detrás del cuello.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de todo, desde semillas, granos, hierbas, insectos, verduras hasta migajas de pan.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



# Trile



## Trile

*Agelasticus thilius*

Es un tordo delgado y colilargo, de largo pico muy fino y puntiagudo. Esta especie mide entre 19 - 20 cm. El macho normalmente es de color negro entero, ya que las coberteras pequeñas amarillas pueden quedar tapadas cuando está posado.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Se alimenta de insectos e invertebrados acuáticos y semillas.

# Yeco



## Yeco

*Nannopterum brasilianum*

Es un cormorán mediano, todo negro, sin vientre blanco. Esta especie mide 58 - 73 cm y posee un borde blanco en el saco gular. Su plumaje reproductor tiene filoplumas blancas al lado del cuello, como una mancha clara. Esta ave posee un pico y patas de color negras.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Su alimento son peces y también pequeños crustáceos.

# Zorzal Patagónico



## Zorzal Patagónico

*Turdus falcklandii MLV*

Es una especie de 23 cm, con patas y pico amarillos. El macho se destaca por su color gris por encima, su cabeza negruzca y garganta blanca con estrías negruzcas. La hembra en cambio es más parda por encima, con cabeza más pálida y pecho con tinte pardusco.



### AVISTAMIENTO

Se puede avistar durante todo el año.



### ALIMENTACIÓN

Su alimentación consiste en caracoles, escarabajos, lombrices, frutos de hierbas y uva.



¡Escúchalo!

Escanea este código QR



## Glosario

### A

**Anisodactilia:** es la disposición más frecuente de los dedos en las aves, con tres dedos adelante y uno atrás.

**Ave:** animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de temperatura constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas, con dos patas y dos alas aptas por lo común para el vuelo.

**Ave paseriforme:** son un gran orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo. Los paseriformes se conocen comúnmente como pájaros y a veces aves cantoras o pájaros cantores. Los paseriformes presentan una característica disposición dactilar. Tienen cuatro dedos, tres dirigidos hacia adelante y otro (el hallux) hacia atrás, disposición denominada anisodactilia. El dedo trasero se une a la pata al mismo nivel que los dedos frontales. Esta disposición dactilar les permite agarrarse a las

ramas de los árboles y a superficies verticales. La mayoría de los paseriformes tienen doce plumas en la cola y nueve o diez plumas primarias en las alas.

**Ave suliforme:** constituye un orden de aves entre las que se encuentran los populares cormoranes, fragatas o los alcatrazes.

**Aves conspicuas:** son el tipo de ave fácilmente detectables en el entorno debido a ciertas características de comportamiento que poseen, cantos, formas de locomoción y colores, son algunos de los rasgos que se pueden seguir para avistar a las aves y conocer aquellas más conspicuas dentro de los hábitats.

**Área cloacal:** la cloaca es una cavidad situada en la parte final del tracto digestivo y abierta al exterior, a la que con-

fluyen también los conductos finales de los aparatos urinario y reproductor. Brinda protección al sistema digestivo y excretor para la expulsión de desechos.

**Anillo periocular:** El anillo ocular, también denominado círculo, área periocular, anillo periocular o anillo orbital, es una zona alrededor del ojo de algunas aves con forma aproximada de corona circular, de piel desnuda o formado por diminutas plumas. El grosor y color de los anillos perioculares varían mucho según las distintas especies.

**Avistamiento:** es la actividad de observar aves silvestres en sus entornos naturales.

### C

**Cera:** zona entre la base del pico y la cabeza; comúnmente de color amarillo en los falconidaeas.

**Conspicuas:** visible, sobresaliente.

**Cormorán:** género de aves suliformes. Son aves acuáticas que capturan peces zambulléndose bajo el agua.

**Coberteras alares o Cubiertas alares:** todas las plumas pequeñas de la parte exterior de las alas.

**Culmen:** vértice o borde superior de la maxila (o mandíbula superior).

**E**

**Envergadura:** distancia entre punta y punta de las alas extendidas.

**F**

**Falconidae:** aves rapaces diurnas en el nivel de familia, como los halcones, cernícalos o alcotanes etc.

**Filoplumas:** son plumas filamentosas, muy delgadas, de raquis largo y unas cuantas barbas en la punta, las cuales se localizan en todo el cuerpo del ave, preferentemente entre las plumas de contorno del dorso y la cabeza. Son difíciles de ver y su función es sensorial y de ornato, pues se vuelven muy largas en algunos plumajes nupciales.

**I**

**Iridiscente:** plumas con brillos metálicos, que varían de color e intensidad de acuerdo a la posición de la pluma con respecto al sol u otra fuente luminosa.

**L**

**Lista ocular:** franja destacada que nace en la base del pico y que atravesando el ojo se extiende hasta la región auricular.

**Línea superciliar:** plumas de tono diferente al de la cabeza, formando una línea que pasa por sobre el ojo. Puede ser ancha o delgada, larga o corta.

**Lorum:** zona de la cara, entre la base del pico y el ojo.

**P**

**Penacho:** Conjunto de plumas levantadas que tienen ciertas aves en la parte superior de la cabeza.

**R**

**Rabadilla:** Protuberancia movable que tienen las aves al final de la columna vertebral, de la cual salen las plumas de la cola.

**Rectriz:** cada una de las plumas largas de la cola.

**S**

**Saco gular:** es una bolsa de piel inflable presente en la región cervical en algunas especies de aves.

**Subalares:** las plumas pequeñas de la parte interna del ala.

**Subcaudales:** plumas pequeñas que cubren la base de las rectrices por la parte inferior del cuerpo del ave.

**Subterminal:** color o tonalidad que se encuentra ubicada antes del borde o final de las plumas.

**Supracaudales:** plumas pequeñas que cubren la base de las rectrices por la parte superior del cuerpo del ave.

**T**

**Tarso:** normalmente la parte desnuda de las piernas del ave. En ciertas especies están cubiertas de plumas pequeñas o plumones (ej.: Lechuza).

**Z**

**Zona auricular:** zona lateral de la cabeza en donde se encuentra el oído.

**Zona dorsal:** se usa para referirse en términos generales a toda la espalda, desde la base del cuello trasero al comienzo de la cola.

**Zona periocular:** área que rodea al ojo.

**Zona ventral:** se usa para referirse en términos generales a toda la parte inferior, desde la base del cuello delantero, pecho, abdomen y comienzo de la cola.

## **Bibliografía**

Jaramillo, A. 2006. Aves de Chile.  
Lynx Ediciones. 240 pp.

## **Fotografías**

Luis Araya Rodríguez.

## **Sonidos**

[www.macaulaylibrary.org](http://www.macaulaylibrary.org)

## **Revisores**

Eduardo Castro  
Ivo Tejada



Financiado por:

